

りきせい

販売名：力精50Ⅱ

成分・分量 1日量1本(50mL)中

チアミン硝化物…10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム…3mg、ピリドキシン塩酸塩…5mg、ニコチン酸アミド…12mg、無水カフェイン…50mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン…30mg、カルニチン塩化物…100mg、ゴオウ抽出液…100μL(ゴオウ2mgに相当)、ニンジンエキス…72.1mg(ニンジン800mgに相当)

添加物：白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、トウガラシチンキ、安息香酸Na、カラメル、エタノール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、香料、L-メントール、グリセリン〔アルコール0.4mL以下〕

●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **田村薬品工業株式会社**
奈良県御所市西寺田50

AL02

50mL

RIKISEI

50Ⅱ

力精50Ⅱ

牛黄・人參 配合

第3類医薬品

使用上の注意

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|----------|
| 皮膚 | 発疹 |
| 消化器 | 胃部不快感、下痢 |

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用する。●用法・用量を厳守すること。●本剤は、まれに沈殿を生じることがある。よく振って服用すること。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)加温、冷凍はさけること。

ガラス：瓶 金属：キャップ

使用期限

製造番号