

【使用上の注意】相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹／消化器：胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1瓶（50mL）を服用してください。
○用法・用量を厳守してください。

【効能】

○滋養強壮 ○虚弱体质
○肉体疲労・病中病後・食欲不振・
栄養障害・発熱性消耗性疾患・
妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

つらい疲れ たまたま疲れに 滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給 **アナロンゴールド**

内服液



【成分・分量】50mL中

ニンジン乾燥エキス45mg(人参671.6mgに相当)、イカリ草流エキス0.5mL(淫羊藿500mgに相当)、オウセイ流エキス0.5mL(黄精500mgに相当)、ゴミシ流エキス0.3mL(五味子300mgに相当)、ローヤルゼリー50mg、L-バリン10mg、L-ロイシン10mg、L-フェニルアラニン10mg、タウリン1000mg、カルニチン塩化物120mg、チアミン硝酸物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩30mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg(アルコール0.5mL以下)

添加物：カラメル、白糖、D-ソルビトール、メタリン酸Na、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料、プロピレングリコール

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中郷1丁目139番地

お客様相談室 電話：0120-584-419

受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

ガラス：瓶、 金属：キャップ

使用期限

製造番号