



## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと  
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと  
(1) 目の周囲、粘膜等。  
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- 3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

## 用法及び用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

## 〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6) 皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

1枚 (6.2cm×4.2cm)

お問い合わせ先 大協薬品工業株式会社  
お客様相談窓口  
電話：076-479-1313  
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
電話：0120-149-931 (フリーダイヤル)

成分及び分量 1.0m<sup>2</sup>中

dl-カンフル ……………1.80g  
サリチル酸メチル ……………9.00g  
ハッカ油 ……………1.20g  
l-メントール ……………4.50g  
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) …0.50g  
ノニル酸ワニリルアミド ……………0.01g  
添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります.)。
- (4) 開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元

大協薬品工業株式会社

富山市水橋島等173