

効く! 肩・腰の痛みに

バスマンシップID1.0%

第2類医薬品

インドメタシン1.0%配合 +ビタミンE

【特長】

インドメタシンを1.0%配合し、痛みの原因物質の生成を抑えることにより、肩の痛み、腰痛、関節痛(五十肩など)に効果をあらわします。

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛(五十肩など)、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲(うちみ)、捻挫

△ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ぜんそくを起こしたことがある人。
 - 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください
 - 目の周囲、粘膜等。
 - 湿疹、かぶれ、傷口。
 - みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 連続して2週間以上使用しないでください



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚7g)

成分	含量
インドメタシン	1.0g
トコフェロール酢酸エステル	0.30g

添加物としてアジピン酸ジイソプロピル、エデト酸ナトリウム水和物、l-メントール、カルメロースナトリウム、グリセリン、酸化チタン、セラチン、D-ソルビトール、pH調節剤、ヒマシ油、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、マクロゴール400、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、密封口のチャックを閉めて保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
株式会社大石膏盛堂 電話(0942)83-2112 受付時間:午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

【製造販売元】株式会社大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

【副作用被害救済制度 電話(0120)149-931(フリーダイヤル)】



セルフメディケーション
税控除対象

押し開ける

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

消炎鎮痛パップ剤 パスマンシップID1.0%

【特長】

- インドメタシンを1.0%配合し、痛みの原因物質の生成を抑えることにより、肩の痛み、腰痛、関節痛（五十肩など）に効果をあらわします。
- 粘着性に優れた基剤と伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリとフィットします。

⚠️【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
株式会社大石膏盛堂
電話 (0942) 83-2112
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛（五十肩など）、腱鞘炎（手・首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲（うちみ）、捻挫

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

成分	含量
インドメタシン	1.0g
トコフェロール酢酸エステル	0.30g

添加物としてアジピン酸ジイソプロピル、エデト酸ナトリウム水和物、L-メントール、カルメロースナトリウム、グリセリン、酸化チタン、セラチン、D-ソルビトール、pH調節剤、ヒマシ油、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、マクロゴール400、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



製造販売元

株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

ここを押して
開けてください。