

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要なときに読めるように大切に保管すること。

眼科薬

目の疲れ・充血に

# マイティア<sup>®</sup>Vプラス

第2類医薬品

販売名 マイティアVプラス

## 特徴

- 充血クリア成分『塩酸テトラヒドロソリン』配合。
- 3つのビタミン(ビタミンB<sub>6</sub>・プロビタミンB<sub>5</sub>・ビタミンE)、ピント調節機能改善成分(ネオスチグミンメチル硫酸塩)、栄養成分(タウリン)、組織修復成分(アラントイン)が目の疲れなどに効果を発揮します。
- 清涼感のある、クールなさし心地です。
- 無色澄明の目薬です。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。  
緑内障

#### 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

#### 3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

## 効 能

結膜充血、目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

## 用法・用量

1回1～2滴を1日3～4回点眼してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがある。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)容器の先を目、まぶた、まつ毛に触れさせないこと(目やにやその他異物等が混入することで、薬液が汚染あるいは混濁することがある)。また、混濁したものは使用しないこと。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
- (5)点眼用のみ使用すること。
- (6)用法・用量を厳守すること。



容器の先が目、まぶた、まつ毛にふれないように

## 成分 1mL中


成分	含量
塩酸テトラヒドロソリン	0.5mg
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.05mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	0.5mg
パンテノール(プロビタミンB <sub>5</sub> )	0.5mg

成分	含量
酢酸d-α-トコフェロール(ビタミンE)	0.5mg
タウリン	10mg
アラントイン	1mg

添加物：塩化ナトリウム、ホウ酸、L-グルタミン酸ナトリウム、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、ℓ-メントール、pH調節剤

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。特に自動車内や暖房器具の近くなど、高温となるおそれのある場所に放置しないこと。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4)容器に他のものを入れて使用しないこと。
- (5)他の人と共用しないこと。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。また、使用期限内であっても、内袋開封後はすみやかに使用すること。
- (7)保存の状態によっては、容器の先周囲やキャップの内側に薬液中の成分の結晶が付くことがある。このような場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用すること。



## 容量 15mL

本製品内容についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
千寿製薬株式会社「お客様インフォメーション」  
〒541-0048 大阪市中央区瓦町三丁目1番9号  
電話 0120-078-552 受付時間：9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **千寿製薬株式会社**  
大阪市中央区瓦町三丁目1番9号