

クラシエの漢方

セルフメディケーション

税 控除対象

# 葛根湯液II

かつ こん どう えき

苦みを抑えて  
飲みやすい\*

かぜのひきはじめ  
頭痛、肩こりに

満量処方

1日2回

栄養ドリンク風味

45mL×2本  
(1日分)

第2類医薬品



クラシエの漢方

葛根湯液II

苦みを抑えて  
飲みやすい\*

かぜのひきはじめ  
頭痛、肩こりに

満量処方

1日2回

栄養ドリンク風味

第2類医薬品

45mL

クラシエ製薬株式会社

\*クラシエ葛根湯液II対比

## △ 使用上の注意

### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人
- むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位 (感冒の初期、鼻がぜ、頭痛に服用する場合には5~6回) 服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

押し開ける

第2類医薬品

販売名: 葛根湯液IIクラシエ

(成分)

成人1日の服用量90mL (45mL×2本) 中

葛根湯エキス……………3,200mg

(カコン4g、マオウ・タイソウ各3g、ケイヒ・シャクヤク・カンゾウ各2g、ショウキョウ1gより抽出)

添加物として、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ソルピタン脂肪酸エステル、パラベン、クエン酸Na、エタノール、安息香酸Na、白糖、ポビドン、シリコーン樹脂、グリセリン脂肪酸エステル、CMC-Na、リン酸、アセスルファムK、スクラロース、香料を含有する。

(効能)

体液中程度以上のものの次の諸症: 感冒の初期 (汗をかいていないもの)、鼻がぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

(用法・用量)

成人 (15才以上) 1回1本、1日2回朝夕、食前又は食間によく振ってから服用する。

15才未満は服用しないこと。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

(保管及び取扱い上の注意)

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(異用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) ピンをあけたら飲みきってください。
- (6) ピンをあけたまま保存しないでください。

製造番号  
使用期限

発売元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(F108-8080)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

お客様相談窓口 (03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

クラシエ 製薬株式会社

東京都港区海岸3-20-20(F108-8080)

副作用被害救済制度の間合せ先

0120-149-931