

第3類医薬品

# リョウシンJV コンドロイ錠

ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>配合  
×  
コンドロイチン

開封年月日

開封時に記入してください。

第3類医薬品

販売名:リョウシンJVコンドロイ錠  
開封口

### ⚠ 使用上の注意

#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
軟便、下痢
- 1ヵ月服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造販売元 米田薬品工業株式会社  
奈良県高市郡高取町市尾986

発売元 株式会社富山常備薬  
富山県富山市丸の内1-8-17

【成分・分量】 2錠中  
フルスルチアミン塩(ビタミンB<sub>1</sub>誘導体)…109.16mg  
(フルスルチアミンとして100mg)  
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)…50mg  
シアノコバラミン(ビタミンB<sub>12</sub>)…60μg  
パントテン酸カルシウム…30mg  
ガンマ-オリザノール…10mg  
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム…180mg  
添加物として、無水ケイ酸、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、リボフラビン、カルナバウパウを含有します。

#### 【効能・効果】

- 次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)
- 脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

- 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給:肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

#### 【用法・用量】

次の量を水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1回
15歳未満		服用しないでください。

#### 【用法・用量に関連する注意】

用法・用量を厳守してください。


31日分62錠

第3類医薬品

# リョウシンJV コンドロイ錠

関節痛・神経痛  
×  
軟骨成分配合  
W処方

つらい痛みに  
ビタミン  
B<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>配合  
×  
コンドロイチン



富山常備薬

服用前に、この説明文をよくお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

#### 【保管及び取り扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 使用期限内に服用してください。また、品質保持の点から、開封後は6ヵ月以内を目安に服用してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限  
製造番号

お問い合わせ先 株式会社富山常備薬  
☎ 0120-137-093  
受付時間:9時~18時(年中無休)



084011



紙

詰め物



紙

箱

瓶:ガラス  
キャップ:金属

1368

2209A



4 580544 060679