この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、 必要な時に読めるよう大切に保管してください。

> ビタミンB1B6B12主薬製剤 眼精疲労・肩こり・腰痛に

第3類医薬品

# パイルス®EXパイα

パイルズEXハイ $\alpha$ は、ビタミンB<sub>1</sub>誘導体であるビスベンチアミンにビタミンB<sub>2</sub>·B<sub>6</sub>·B<sub>12</sub>、天然型ビタミンE、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム及びガンマーオリザノールを配合した黄色のフィルムコーティング錠です。

神経・筋肉系に作用して肩こり、神経痛、腰痛や目を酷使する現代人に起こりがちな眼精疲労の緩和に優れた効果を発揮します。

#### ⚠ 使用上の注意

#### △ 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



	関係部位	症    状
	皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
Ţ	消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること軟便、下痢、便秘
- 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が 長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 効 能

○ 次の諸症状の緩和:眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、神経痛

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

○ 次の場合のビタミンB1B2B6B12の補給: 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

#### 用法•用量

次の量を、食後すぐに、水又はお湯でかまずに服用してください。

年齢	1回量	服用回数	
成人(15才以上)	2~3錠	1⊟1 回	
15才未満	服用しないこと		

<用法・用量に関連する注意> 用法・用量を厳守してください。

#### 成分•分量

3錠中

成分名	分 量	作用
ビスベンチアミン (ビタミンB1誘導体)	114.28mg	吸収に優れたビタミンB1で、不足すると、眼精疲労、神経痛、手足のしびれなどの症状があらわれます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	100mg	筋肉や神経の機能を正常に保ちます。
シアノコバラミン (ビタミンB12)	1500µg	末梢神経の機能を正常に保ち、手足のしびれ、神経痛を緩和します。
コハク酸 d - α - トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	末梢血管を拡張して血行をよくし、肩こり、手足のしびれの緩和に効果があります。
ニコチン酸アミド	60mg	ビタミンB1やビタミンB6などと協力し、筋肉や神経でのエネルギー産生を促します。
パントテン酸カルシウム	30mg	脂質や糖質の代謝に関与し、肉体疲労時の栄養補給に役立ちます。
ガンマーオリザノール	10mg	自律神経の乱れをコントロールします。
リボフラビン (ビタミンB2)	10mg	エネルギー供給や目の健康に必要なビタミンです。

添加物:乳酸Ca水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、乳糖水和物、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、アセスルファムK、カルナウバロウ

#### <成分・分量に関連する注意>

リボフラビン(ビタミンB2)により、尿が黄色になることがありますが、ご心配ありません。

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤に付着しますと、表面の一部が溶けて斑点を生じることがありますので、誤って水 滴を落としたり、ぬれた手でふれないでください。
- (6)ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は 取り除いてください。これをビンに出し入れしますと異物混入の原因になることがあります。

製品についてのお問い合わせは、お買い求め先 又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室電話:0120-584-419 受付時間:10時~16時(土、日、祝日を除く)

#### 副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構 ■ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

## 小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鶉1丁目139番地