

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



メンソレータム®

メディクイック®N軟膏

鼻などのかゆみ・皮膚炎治療薬

メンソレータム®メディクイック®N軟膏

第②類医薬品



管理コード  
512086A1

メンソレータム®メディクイック®N軟膏は  
鼻の穴入口やまわりのかゆみに効くお薬です。

## こんなとき、鼻が痛がゆくてお困りの方に

乾燥



鼻のかみすぎ



摩擦・こすれ



## 4つの有効成分が痛がゆい炎症にアプローチ

素早くかゆみを抑える  
リドカイン

患部を殺菌  
イソプロピル  
メチルフェノール

かゆみ  
炎症

かゆみの原因となる  
炎症をおさえる  
プレドニゾン吉草酸  
エステル酢酸エステル

血行を促進する  
ビタミンE誘導体

## 鼻の穴入口にも、鼻のまわりにも使える

### 鼻の入口に使用する場合

清潔にご使用いただくため、また鼻の中を傷つけないため綿球の下を持ってご使用ください。

※裏面<鼻の穴入口に使用する場合の注意>をよくお読みの上、ご使用ください。

鼻の入口に  
綿棒で塗る



### 鼻のまわりに使用する場合

患部にお薬をのせ、擦りこまずにやさしくのばしてください。

鼻のまわりに  
指で塗る





## 使用上の注意

**× してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の部位には使用しないでください。  
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部  
(2) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
- 顔面には、広範囲に使用しないでください。
- 長期連用しないでください。



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(4) 患部が広範囲の人  
(5) 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ
皮フ(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

■効能・効果 かゆみ、皮フ炎、湿疹、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ

- 用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。  
最初にご使用になるときは、キャップを逆さにしてチューブの口に強く押し込んで穴をあけてください。  
<用法・用量に関連する注意>  
(1) 用法・用量を厳守してください。  
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。  
(3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。  
(4) 外用にのみご使用ください。

<鼻の穴入口に使用する場合の注意>

- 鼻毛の生えているところのみ使用し、粘膜には使用しないでください。
- 小児(15才未満)は使用しないでください。
- 綿棒で鼻の中を傷つけないように注意してください。  
また、鼻の奥まで綿棒を入れないでください。
- 綿棒使用の際は、綿球の下を持って、こすらずにやさしく塗布してください(右図)。
- 化膿しているところには使用しないでください。
- 長期連用しないでください。
- 症状が治りにくい時、また、慢性的に症状をぶりかえす方は、医師に相談してください。



- 成分・分量 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(合成副腎皮質ホルモン) 1.5mg、  
(1g中) リドカイン10mg、イソプロピルメチルフェノール1mg、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体) 5mg  
添加物: ミリスチン酸イソプロピル、セトステアリルアルコール、  
N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド、流動パラフィン、  
ワセリン、パラフィン

- 保管及び取扱い上の注意
- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
  - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
  - (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
  - (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先: ロート製薬お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京: 03-5442-6020 受付時間 9:00~18:00  
大阪: 06-6758-1230 (土、日、祝日を除く)

【発売元】 ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

【製造販売元】 ジャパンメディック株式会社  
富山市横越168