

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

第2類医薬品

湿疹、かゆみ、虫さされに

中京サロカインジェルα

中京サロカインジェルαは、かゆみを素早く鎮める成分である「ジフェンヒドรามイン塩酸塩」「ジブカイン塩酸塩」、炎症・赤み・はれを抑える「グリチルレチン酸」、患部に清涼感を与え、かゆみを鎮める「l-メントール」「dl-カンフル」を配合しています。

湿疹やかゆみ、蚊・ハチ・アリ・毛虫などの虫さされ、じんましんなどに効果を発揮する、べたつきがなく使い心地の良い非ステロイドのゲル剤です。

⚠ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1 日数回、適量を患部に塗擦又は塗布してください。

《用法・用量に関連する注意》

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 100g 中

成 分	分 量	作 用
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみの元となるヒスタミンの働きを抑え、かゆみを鎮めます。
ジブカイン塩酸塩	0.3g	局所麻酔作用により、かゆみを鎮めます。
グリチルレチン酸	0.3g	炎症を抑えます。
l-メントール	5.0g	患部に清涼感を与え、かゆみを鎮めます。
dl-カンフル	3.0g	

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、プロピレングリコール、ステアリン酸ポリオキシル、エタノール、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、パラベン

【保管及び取扱い上の注意】

1. 高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。又、開封後は期限内であってもなるべく早く使用してください。
5. 火気に近づけないでください。

本剤についてのお問い合わせは、
下記までご連絡ください。

株式会社 雪の元本店 お客様相談室
〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
TEL 0744-22-2440

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)



株式
会社

中京医薬品

愛知県半田市亀崎北浦町2-15-1

〈発売元〉

製造販売元

株式会社 雪の元本店

奈良県橿原市大谷町182番地