

ご使用に際しては、この箱の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。



内容量：10g
品名：ベタメゾン軟膏
湿疹・皮ふ炎治療薬

第2類
医薬品

 使用上の注意

ⓧ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 次の部位には使用しないでください。(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部(2)目、目の周囲 3. 顔面には、広範囲に使用しないでください。 4. 長期連用しないでください。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(4)患部が広範囲の人(5)湿潤やただれのひどい人 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、白くなる

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

湿疹、皮ふ炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【成分・分量】 (1g中)

ベタメゾン吉草酸エステル 1.2mg
添加物：流動パラフィン、白色ワセリン

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【用法・用量】

1日1回～数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)定められた用法・用量をお守りください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用し、内服しないでください。(5)使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。また、おむつのあたる部分に使うときは、ぴったりとしたおむつやビニール製の密封性のあるパンツは使用しないでください。(6)化粧下、ひげそり後等に使用しないでください。

お薬の塗り方



お薬を指に取ります。



患部に点々とお薬を置きます。



患部を覆うようにやさしく伸ばします。
△ 擦り込まない!

- 表面がテカってべたつくくらいが適切です。
- 長期連用はしないでください。

ステロイド外用剤のランク

医療用医薬品のみ

弱 ウィーク マイルド **ストロング** 強
ベリーストロング ストロングゲスト

↑ **ベタメタゾン吉草酸エステル**

ベタメタゾン吉草酸エステルは、一般用医薬品の中で、強い「ストロングランク」に分類されます。

1g中

☑ **ベタメタゾン吉草酸エステル 1.2mg**

第2類医薬品

ステロイド配合剤
ベタメゾン軟膏

セルフメディケーション

税控除対象

製造販売元

ジャパンメテリック株式会社

富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎ 076-438-1107

受付時間：月～金(祝日、年末年始を除く)9:00～17:00

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



FSC

ミックス
パッケージ

FSC® C111644



一部に植物油インキ以外のものを使用しています。



箱台紙



4 956622 110602