

✂ ここからハサミでお切りください。

手足のしびれ 神経痛、関節痛の つらい痛みを緩和

1日量

フルスルチアミン塩酸塩 109.16mg、トコフェ
ロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE)
103.58mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)
100mg、パントテン酸カルシウム 30mg、
シアンコバラミン(ビタミンB12) 1,500µg、
ガンマーオリザノール 10mg

1日2錠

第3類医薬品

シビリトル

コースシックス シビリトル
60錠(30日分)

∴6
Cause Six by NR



✂ ここからハサミでお切りください。

開封後は、湿らないようにチャックを合わせて端からしっかり押さえてください。

ビタミンB1B6B12 主薬製剤 販売名:コースシックス シビリトル 60錠

第3類医薬品

服用の際はこの説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△使用上の注意

■相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】●次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉痛、関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)【ただし、これらの症状については、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。】●次の場合のビタミンB1・B6・B12の補給:肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】次の量を服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1~2錠	1回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】1日量(2錠)中

成分	分量	成分	分量
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB ₆ 誘導体) [フルスルチアミンとして]	109.16mg (100mg)	トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE) [トコフェロールコハク酸エステルとして]	103.58mg (100mg)
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	100mg	パントテン酸カルシウム	30mg
シアンコバラミン(ビタミンB ₁₂)	1,500µg	ガンマーオリザノール	10mg

添加物として、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、乳糖水和物、バレイシヨデンブ、乳酸Ca水和物、ステアリン酸Mg、酸化チタン、タルク、ヒプロメロース、マクロゴール、リボフラビンリン酸エステルNaを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)(4)服用の都度チャックをしっかり閉じてください。(5)使用期限を過ぎたものは服用しないでください。(6)袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。

発売元:株式会社NR

東京都中央区日本橋小伝馬町4-3
フジスター小伝馬ビル7F
製造販売元: 薬業化学工業株式会社
奈良県大和高田市旭南町2番25号

本製品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

製品のお問合せ先: NR SHOP ☎03-6667-0442
お客様相談窓口: 受付時間 10:30~17:30(土、日、祝日を除く)
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限

製造番号

YM4255221111 MADE IN JAPAN

