

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

【漢方薬】

ハイイン®EP錠

第2類医薬品

252錠

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸の弱い人
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 1ヵ月位(化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期)に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 体力中等度なものの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
15歳未満7歳以上	4錠	
7歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 18錠(3.6g)中
(オウヒ0.90g・カンキョウ0.36g・カンゾウ0.54g・キキョウ0.90g・ケイガイ0.54g・サイコ0.90g・センキュウ0.90g・ドクカツ0.54g・ブクリョウ0.90g・ボウフウ0.90g) 十味敗毒湯エキス1.0g、オウヒ末0.132g、カンキョウ末0.053g、カンゾウ末0.079g、キキョウ末0.132g、ケイガイ末0.079g、サイコ末0.132g、センキュウ末0.132g、ドクカツ末0.079g、ブクリョウ末0.132g、ボウフウ末0.132g

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、乳糖、バレイショデンブン、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 袋の中に乾燥剤を入れてあります。誤って服用しないよう注意してください。
- (5) 使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

【発売元】 株式会社MORI PHARMACY
東京都豊島区北大塚3-25-16伊納ビル2F
問合せ先：090-7519-2946
(平日10時～19時)

【製造販売元】 劑盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931