

この説明文書は、服用前に必ずお読みください。  
また、必要時に読めるよう保管してください。

第2類医薬品

販売名:ハイインEP錠(漢方薬)

### △ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人  
(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 1ヵ月位(化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。3. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】体力中等度なものの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症:化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫

【用法・用量】次の量を食前又は食間に、コップ半分以上の水又は白湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
15歳未満7歳以上	4錠	
7歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】18錠(3.6g)中

十味敗毒湯エキス1.0g(オウヒ0.90g・カンキョウ0.36g・カンゾウ0.54g・キキョウ0.90g・ケイガイ0.54g・サイコ0.90g・センキュウ0.90g・ドクカツ0.54g・ブクリョウ0.90g・ポウフウ0.90g)、オウヒ末0.132g、カンキョウ末0.053g、カンゾウ末0.079g、キキョウ末0.132g、ケイガイ末0.079g、サイコ末0.132g、センキュウ末0.132g、ドクカツ末0.079g、ブクリョウ末0.132g、ポウフウ末0.132g 添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、乳糖、パレシヨンドンプン、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

◎本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

【保管及び取扱上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)袋の中に乾燥剤を入れてあります。誤って服用しないよう注意してください。(5)使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

発売元:ミライズ製薬株式会社  
東京都中央区築地6丁目22-4  
お問い合わせ先:未来堂  
電話 0570-78-3639

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元:劑盛堂薬品株式会社  
和歌山県和歌山市太田二丁目8番31号