

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

## 第2類医薬品

# 漢方胃腸薬 JII

漢方胃腸薬 JIIは、胃腸薬として汎用されている「安中散」に痛みを改善する「芍薬甘草湯」をあわせた製剤です。2つの漢方処方です。胃のもたれや胃部不快感、胃痛などを改善します。本剤は安中散の生薬粉末と芍薬甘草湯の乾燥エキスをあわせ、服用しやすい細粒剤としました。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の人は服用しないでください  
次の診断を受けた人。心臓病

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。むくみ  
(6) 次の診断を受けた人。高血圧、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこぼばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

胃痛、腹痛、胃部不快感、胃炎、胃のもたれ、胃酸過多、げっぷ、胸やけ、はきけ、食欲不振、腹部膨満感

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1 包	3回
5才以上15才未満	1/2 包	
5才未満	服用しないこと	

### <用法・用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 食間とは食後2~3時間を指します。

## 成分・分量

3包(3.6g)中

日局ケ イ ヒ	600mg	日局エンゴサク	450mg
日局ボ レ イ	450mg	日局ウイキョウ	225mg
日局シュクシャ	150mg	日局カンゾウ	150mg
日局リョウキョウ	75mg	芍薬甘草湯乾燥エキス	459mg

〔日局シャクヤク 1,020mg〕  
〔日局カンゾウ 1,020mg〕に相当

添加物として、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有しています。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 本剤は吸湿しやすいので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。(開封状態で置いておくと本剤が変色することがあります。変色した場合は、服用しないでください。)
- 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果にはかわりありません。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。  
**ジェーピーエス製薬 お客様相談室**  
電 話 **045-593-2136**  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電 話 **0120-149-931** (フリーダイヤル)

## ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1  
発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22