

壮年性脱毛症における発毛剤

第1類医薬品

販売名：ヘアキシジル1プラス レディース

ヘアキシジル1プラス レディースの特徴

- ミノキシジルを1%配合した女性の壮年性脱毛症のための発毛剤
- 頭皮の環境を整えるパントテンールエチルエーテル、トコフェロール酢酸エステル、*l*-メントールを配合

○「高血圧、低血圧で現在治療を受けている人」、「狭心症等、心臓に障害のある人」は、医師又は薬剤師に相談してください。

○購入前の確認事項について、専用のセルフチェックシートによりセルフチェックを行い、本剤の使用が適切かどうか確認してください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。〉

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 未成年者(20歳未満)。(国内での使用経験がありません。)
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人。(妊娠中の使用については、十分確認されていません。また、ミノキシジルは母乳中に移行します。)
- (4) 妊娠、出産に伴い脱毛している人。(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。)
- (5) 避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人。(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。)
- (6) 壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。(本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。)
- (7) 頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。(男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)
- (8) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。)
- (9) 頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人。(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。)
- (10) 男性。(男性の方は男性用のミノキシジル含有製剤をご使用ください。)

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。(血圧が下がる等のおそれがあります。)
- (2) ぎず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。(ぎず等を悪化させることがあります。)

3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。(これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。)

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) 高血圧の人、低血圧の人(本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。)
- (3) 心臓又は腎臓に障害のある人。(本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。)
- (4) むくみのある人。(むくみを増強させる可能性が考えられます。)

- (5) 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。(壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。)
- (6) 高齢者(65歳以上)。(一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。)
- (7) 次の診断を受けている人。甲状腺機能障害。(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症。)(甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。)

2. 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	頭皮の発疹・発赤 [※] 、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循環器	胸の痛み、心拍が速くなる
代謝系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ

※頭皮以外に現れることもあります

3. 6ヶ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)(男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性が高い可能性があります。)

4. 使用開始後6ヶ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。頭頂部だけでなく側頭部や後頭部など頭部全体の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛など。(男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)

その他の注意

1. 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヶ月間、毎日使用してください。(本剤の有効性は6ヶ月使用した場合に認められています。)
2. 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。
3. 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。(本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。)

■ 効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。

この医薬品の対象となる壮年性脱毛症



※脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られない可能性があります。

■ 用法・用量

成人女性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布する。



使い方については、
スマートフォン等でこちらの
QRコードを読み取ってご覧ください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法、用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法、用量を厳守してください。
(決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります。)
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 薬液のついた手で、目などの粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
- (4) 髪の毛の長い人は、髪を押し広げ、髪に薬液がつかぬよう、頭皮に丁寧に塗布してください。
- (5) アルコールなどに溶けるおそれのあるもの(メガネわく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。
- (6) 整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
- (7) 染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。
- (8) つけ毛やヘアピースを着用の方は本剤を十分に乾燥させた後に装着してください。

■ 成分・分量(100mL中)

成分	分量	はたらき
ミノキシジル	1.00g	発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。
パントテニールエチルエーテル	1.00g	毛細胞に栄養を補給し、頭皮を健全な状態にします。
トコフェロール酢酸エステル	0.08g	皮脂の酸化を防ぎ、頭皮を保護します。
l-メントール	0.30g	頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあたえます。

添加物としてエタノール、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム、pH調整剤を含有します。

■ 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所をさけ、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

— 製品についてのお問い合わせ先 —

ミナカラお客様相談窓口
受付時間: 10:00-16:00(平日・月-金)

☎ 03-5544-8440

— 副作用被害救済制度のお問い合わせ先 —

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931

販売元: ミナカラ薬局

東京都千代田区内神田3丁目-18-3 SDビル4階

<https://minacolor.com/>

製造販売元: 富士化学工業株式会社

富山県中新川郡上市町郷柿沢1



QRコードから詳しい製品情報にアクセスしたり、お薬について薬剤師に相談できるアフターサポートも提供しています。
URL: <https://minacolor.com/pages/questions>