

この説明書は、本剤を服用する前に必ずよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

2022年8月

第②類医薬品

A1

目の乾燥
骨歯の発育不良

アスゲンAD

ビタミンAD主薬製剤

特 徴

1. 本剤は目の乾燥の緩和や健康な骨・歯を作るために必要なビタミンA、カルシウム、ビタミンDをバランスよく配合したお薬です。
ビタミンAは目の乾燥(ドライアイ)、粘膜の乾燥に効果をあらわします。乳酸カルシウムは骨や歯の生成に必要な成分、コレカルシフェロール(ビタミンD₃)は腸管でカルシウムの吸収を助けるビタミンです。ビタミンEは抗酸化作用により細胞の正常な働きを助けるビタミンです。
アスゲンADは育ち盛りのお子様から働き盛りの方、年齢を重ねられた方まで広く愛用できる保健剤です。
2. ラグビーボール型の小さく飲みやすいソフトカプセル剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。
(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告があります。)
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	かゆみ、発疹・発赤
消 化 器	吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢、便秘
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 次の症状の緩和：目の乾燥
- 骨歯の発育不良
- 夜盲症（とり目、暗所での見えにくさ）
- くる病の予防
- 次の場合のビタミンADの補給：
妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、発育期、老年期

用法・用量

次の1回服用量を1日1回、なるべく空腹時をさけて、水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回 服 用 量
成人（15歳以上）	1回2カプセル
5歳以上15歳未満	1回1カプセル
5歳未満	服用しないでください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

2カプセル（1日量）中

成 分	分 量	働 き
ビタミンA油 (ビタミンAとして)	4mg (4,000国際単位)	皮膚や粘膜の正常な働きを助けるビタミンです。 また、目の乾燥を緩和します。
コレカルシフェロール (ビタミンD ₃ として)	10μg (400国際単位)	腸管でカルシウムの吸収を促進し、骨、歯へのカルシウム沈着(供給)を助けるビタミンです。
乳酸カルシウム水和物	340mg	骨や歯の形成に必要なミネラルです。
酢酸d-α-トコフェロール (ビタミンE)	14mg	抗酸化作用により体内の脂質を酸化から守り、細胞の正常な働きを助けるビタミンです。

※添加物として、グリセリン脂肪酸エステル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、ゼラチン、グリセリン、酸化チタンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)水分がカプセルに付きますと内容成分の変化の原因となりますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (5)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室
電話 03-3370-7174(代表)
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発 売 元

日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

企画開発元

アスゲン製薬株式会社
岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008

製造販売元

ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168