

第2類医薬品

かぜの初期症状に

葛根湯

液体かぜ薬

満量処方

葛根湯内服液T

発熱/さむけ/鼻水

のどの痛み/頭痛

肩・首筋のこわばり

30mL

本剤は本質的に沈殿物を含んでおりますので、よく振ってから服用してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)短期間の服用にとどめ、連用しないでください

☒ 相談すること1次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

登録品目番号24-549

【成分・分量】1日量3本(90mL)中

葛根湯エキス……………4310mg
 [カコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケヒ3g]より製したエキス
 シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g

添加物として、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、アセスルファムK、スクラロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン脂肪酸エステル、安息香酸Na、パラベン、エタノール、プロピレングリコール、パニリン、香料、着色料(カラメル)を含有する。

【効能・効果】かぜの初期症状(発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)

【用法・用量】成人(15歳以上)1回1本(30mL)、1日3回食間によく振ってから服用してください。●(1)用法・用量を厳守してください。(2)15歳未満の小児には服用させないでください。(3)成人(15歳以上)は1回1本とし、1日3本を超えて服用しないでください。(4)本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社廣胃堂

富山市鶴沢町2丁目9-1

(お客様相談窓口)電話076-424-2259

副作用救済制度 ☎0120-149-931

ガラス瓶

金 属キャップ

使用期限

製造記号