

【効能・効果】
筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛
み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・
手首の痛み)、肘の痛み(テニ
ス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】
1日4回を限度として適量を
患部に塗擦してください。
〈用法・用量に関連する注意〉
(1) 11歳以上の小児に使用
させる場合には保護者の指導
監督のもとに使用させてくだ
さい。(2) 11歳未満の小児には
使用させないでください。(3) 目
に入らないよう注意してくだ
さい。万一、目に入った場合
には、すぐに水またはぬるま湯で
洗ってください。なお、症状が重
い場合には、眼科医の診療を
受けてください。(4) 外用にの
み使用してください。(5) 1週間
当たり50gを超えて使用しな
いでください。(6) 薬剤塗擦後の
患部をラップフィルムなどの通
気性の悪いもので覆わないで
ください。(7) 定められた用法・
用量をお守りください。

新大和漢方株式会社



健爽 疾風 関節痛・腰痛・筋肉痛に

80g

第2類医薬品

【成分・分量】100g中
インドメタシン……1,000mg
ℓ-メントール……6,000mg
トコフェロール酢酸エステル
……2,000mg
添加物: BHT、ポリソルベート
80、ミリスチン酸イソプロピル、
アジピン酸ジイソプロピル、ポリ
オキシエチレン硬化ヒマシ油、
ポリオキシエチレンポリオキシブ
ロピレンセチルエーテル、カルボ
キシニルポリマー、ジイソプロ
パノールアミン、チオ硫酸Na水
和物、エドト酸Na水和物、バラ
ベン

【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない湿気
の少ない涼しい所に密栓して保
管してください。(2) 小児の手の
とどかない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れかえないで
ください。(誤用の原因になったり
品質が変わる)(4) 本剤のつい
た手で、目などの粘膜にふれない
でください。(5) 使用期限(外箱
及びチューブに記載)を過ぎた製
品は使用しないでください。

発売元
新大和漢方株式会社
福岡県福岡市早良区千隈3-16-1
電話 0120-702-866

製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

ここから
開けてください

第2類医薬品

販売名 健爽疾風Z (クリーム剤)

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
が起りやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー
症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等または化膿してい
る患部。
3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または
登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起
したことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作
用の可能性があるため、直ちに使用を中止
し、この説明文書を持って医師、薬剤師ま
たは登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、 ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場
合は使用を中止し、この説明文書を持って
医師、薬剤師または登録販売者に相談し
てください

遊 園 地
遊 園 地