

シスビーオールクリア

第3類医薬品

〔特徴〕

L-システインとアスコルビン酸(ビタミンC)が協力して、メラニンの生成をおさえ、肌細胞の代謝を促進させ、しみ、そばかすや日焼けによる色素沈着を緩和します。
また、リボフラビン(ビタミンB₂)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)、ニコチン酸アミド(ビタミンB₃)、ビオチン(ビタミンH)の4つのビタミンが、からだの代謝を助け、肌の機能を正常に整えます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなるらない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効 能

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

● 用法・用量

成人(15歳以上) …………… 1回2錠 7歳以上15歳未満 …………… 1回1錠
7歳未満 …………… 服用しないでください。 1日2回、朝夕に水又はお湯で服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ・用法・用量を厳守してください。
- ・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

● 成分・分量 4錠中

L-システイン …………… 240mg	リボフラビン(ビタミンB ₂) …………… 6mg
アスコルビン酸(ビタミンC) … 1,000mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆) …… 12mg
ビオチン …………… 500μg	コハク酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE) …… 50mg
ニコチン酸アミド …………… 60mg	

添加物として、セルロース、乳糖水和物、カルメロースカルシウム、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(4) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。また、品質保持の点から、開封後は6ヵ月以内を目安に服用してください。

米田薬品工業株式会社
製造販売元 奈良県高市郡高取町尾936

080040



本品について お客様相談室 TEL0120-18-3548
お問い合わせ先 月～金曜日(祝日を除く) 10:00～16:00

副作用被害救済制度 TEL0120-149-931 2108A