

この説明文書は服用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## たん・たんのからむせきに

鎮咳去痰薬

# コフチール 去たん薬

第2類医薬品

コフチール去たん薬は、粘るたんを薄めると共に、のどの粘膜を修復する働きでたんの排出をスムーズにするL-カルボシステインと、気道分泌物を増加させてたんを薄め、排出を容易にするプロムヘキシン塩酸塩の2つの去たん成分を配合した、飲みやすいカプレットタイプの錠剤です。たんがからむ、たんのからむせきが出るなどの不快なたんの症状に効きます。

### △ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

必ずお読みください。



### ☎ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)高齢者。  
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5)次の症状のある人。 高熱  
(6)次の診断を受けた人。 心臓病、肝臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢、口のかわき
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

裏面もお読みください

## 効能・効果

たん、たんのからむせき

## 用法・用量

次の1回量を、1日3回食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	成人 (15才以上)	8才～14才	8才未満
1回量	2錠	1錠	服用しないこと

本剤の服用により、一時的にたんの量が増加することがあります。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)右図のように錠剤が入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 成分・分量

6錠中

成分名	分量	作用
L-カルボシステイン	750mg	粘性の高いたんを薄めるとともに、のどの粘膜を修復して、たんの排出を容易にします。
プロムヘキシシン塩酸塩	12mg	粘るたんを溶解するとともに、気道分泌物を増加させてたんを薄めて排出を容易にします。

添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、還元麦芽糖水アメ、乳糖水和物、セルロースを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)表面の一部が溶けて斑点になりますので、ぬれた手でふれないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
福地製薬株式会社  
お客様相談窓口 電話：0748-52-2323  
受付時間 9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 **福地製薬株式会社**  
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824