

ビタCチュアブル2000

第3類医薬品

— 1日量ビタミンC 2000mg 含有 —

ビタミンCは不足すると、疲れや病気に対する抵抗力が低下するなど、体調を維持する為に必須のビタミンです。しかし、ビタミンCは人の体内で作りに出ることができず、医薬品や食品から補給する必要があります。ビタCチュアブル2000は、ビタミンCを12錠中に2000mg含有する、黄色い小粒のチュアブル錠です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 成分・分量 1日量(12錠)中

アスコルビン酸 1,000mg アスコルビン酸カルシウム
 リボフラビン酪酸エステル 12mg (アスコルビン酸として1,000mg) 1,210mg
 添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、エリスリトール、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、グリチルリチン酸二カリウム、香料を含有します。

● 用法・用量

15歳以上 1回 4錠 7歳以上15歳未満 1回 2錠
 5歳以上7歳未満 1回 1錠 5歳未満は服用しないでください。
 1日3回 食後、かむか、口中で溶かして服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ・用法・用量を厳守してください。
- ・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

● 効能

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。

