



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

湿疹、皮ふ炎治療薬

ホームメディックフォルテ軟膏



管理コード
512087A1

製品特徴

ステロイド成分のベタメタゾン吉草酸エステルが、湿疹、かぶれ等の皮ふの炎症にすぐれた効き目を発揮します。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2.次の部位には使用しないでください。

(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部

(2)目、目の周囲

3.顔面には、広範囲に使用しないでください。

4.長期連用しないでください。



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人

(2)妊娠又は妊娠していると思われる人

(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(4)患部が広範囲の人

(5)湿潤やただれのひどい人

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、白くなる

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

湿疹、皮ふ炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

湿疹、皮ふ炎	あせも、じんましん	かぶれ、かゆみ	虫さされ	しもやけ

用法・用量

1日1回～数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5)使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
また、おむつのあたる部分を使うときは、ぴったりとしたおむつやビニール製等の密封性のあるパンツは使用しないでください。
- (6)化粧下、ひげそり後等に使用しないでください。

<チューブの穴の開け方>



キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。

成分・分量

成分	分量(1g中)	はたらき
ベタメタゾン吉草酸エステル	1.2mg	副腎皮質ホルモンの一つで、炎症をおさえ、かゆみをしめる

添加物:流動パラフィン、ワセリン

保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

ぬり薬の豆知識

Q ステロイド外用薬と保湿剤、同時に使うときはどっちを先に塗ったらいいの？

A

保湿剤

ステロイド外用薬



ステロイド外用薬を先に塗ると、患部以外の皮膚にもステロイド成分が広がってしまいます。保湿剤のあとに、ステロイド外用薬を塗りましょう。

※医師の指示がある場合は、その順序に従ってください。

お問い合わせ先

お客様
相談窓口

076-438-1107

受付 月～金 9:00～17:00
時間 (祝日・年末年始を除く)

製造販売元：ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168