

第2類医薬品

ホームメディックアルフィーネミルケジェル 50g

乾燥性皮ふ治療薬

【効能・効果】手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとでの皮ふのしづり・つぱり(顔面を除く)、打身・ねんざのはれ・筋肉痛・関節痛

【用法・用量】1日1～数回、適量を患部に擦り込むか、またはガーゼ等にのばして貼ってください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意ください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量】(100g 中) ハバリン類似物質 0.3g、コフェロール酢酸エスチル(ビタミンE) 0.5g

添加物:トリソノクタングリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、セトステアリルアルコール、スクラン、ジメチルポリシリコキサン、ポリオキシエチレンボリオキシプロピレンセチルエーテル、ステアリン酸マクロコール、ステアリノ酸セリシン、グリセリン、カルボンシビニルポリマー、パラベン、シンプロパノールアミン

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるものがあります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

目的、結果(口腔、鼻腔、喉、気道)

2次の重症化(呼吸困難、心不全など)

(直射日光又は温熱の直接作用によるもの)

(2) 本剤の外用部位に重大な炎症をきたす場合(皮膚炎など)

(1) 出血傾向(鼻出血など)、頭痛、頭痛(頭痛など)

1次の人件費用削減効果、薬剤販売促進効果(効率化)

2次的人件費用削減効果(効率化)

3次の人件費用削減効果(効率化)

4次の人件費用削減効果(効率化)

5次の人件費用削減効果(効率化)

相談窓口(電話)

350-900-0000(本邦内) 0120-149-931(全国)

薬剤師又は登録販売者による相談窓口(電話)

お問い合わせ窓口(電話)

お問い合わせ窓口(電話)