

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ここを押して
開けてください

ロキエフェクトLXテープQ

第2類医薬品

【特長】

- すぐれた鎮痛消炎効果のあるロキソプロフェナトリウム水和物を8.1%配合。
- ロキソプロフェナトリウム水和物が皮膚から吸収され、変化した活性体が直接痛みに効きます。

⚠ (使用上の注意)

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。
(3) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜炎等。
(2) しっしん、かぶれ、傷口。
(3) みずむしたむし等又は化膿している患部。
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください
4. 連続して2週間以上使用しないでください(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診察を受けてください)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(4) 高齢者
(5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水泡、青あざができる、色素沈着
消 化 器	胃部不快感、みぞおちの痛み
そ の 他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 使用後、次の症状があらわれたことがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下剤・軟便
4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(他の疾患の可能性があります)

【効能・効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日1回患部に貼付してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 1日あたり4枚を超えて使用しないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。
ロキソプロフェナトリウム水和物 …… 8.1g(無水物として7.14g)
L-メントール …… 3.5g
トコフェロール酢酸エステル …… 2.3g
添加物として脂環族飽和炭化水素樹脂、水添ロジングリセリンエステル、ステレン-イソブレン、スチレンブロック重合体、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべくすみやかに使用してください。

製造販売元 株式会社大石膏盛堂
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社大石膏盛堂
電 話 (0942)83-2112
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害者救済制度 ☎0120-149-931

第2類医薬品

ここを押して
開けてください

ご使用に際して、この説明書を必ずお読
みください。また、必要な時に読めるよう
に大切に保管してください。

ロキエフェクトLXテープα

【特長】

- すぐれた鎮痛消炎効果のあるロキソプロフェナトリウム水和物を8.1%配合。
- ロキソプロフェナトリウム水和物が皮膚から吸収され、変化した活性体が直接痛みに効きます。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) しっしん、かぶれ、傷口。(3) みずむし、たむし等又は化膿している患部。
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください
4. 連続して2週間以上使用しないでください(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 高齢者(5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキ)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(下痢・軟便)
4. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(他の疾患の可能性あります)

【効能・効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日1回患部に貼付してください。

〈用法・用量に關連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 1日あたり4枚を超えて使用しないでください。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所(1~2cm角)の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

成分	含量
ロキソプロフェナトリウム水和物	8.1g(無水物として7.14g)
L-メントール	3.5g
トコフェロール酢酸エステル	2.3g

添加物として脂環族飽和炭化水素樹脂、水添ロジンジリセリンエステル、ステレン-イソブレン-ステレンブロック重合体、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になり品質が変わります)(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを開けて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべくすみやかに使用してください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社大石膏盛堂 電話(0942)83-2112
受付時間 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



第2類医薬品

ロキソプロフェンナトリウム水合物テープα

ここを押して
開けてください

ご使用に際して、この説明書を必ず
お読みください。また、必要な時に読
めるように大切に保管してください。

特長

- すぐれた鎮痛消炎効果のあるロキソプロフェンナトリウム水合物を8.1%配合。
- ロキソプロフェンナトリウム水合物が皮膚から吸収され、変化した活性体が直接痛みに効きます。

⚠(使用上の注意)

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) しっしん、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし、たむし等又は化膿している患部。
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください
4. 連続して2週間以上使用しないでください (本剤は痛みを一時的におさえるものでします。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診察を受けてください)

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 高齢者
 - (5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありま
すので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤
師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 使用後、次の症状があらわれたことがありますので、このよう
な症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説
明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢、軟便
4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、
この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して
ください(他の疾患の可能性あります)

効能・効果

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)

用法・用量

表面のライナーをはがし、1日1回患部に貼付してください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 1日あたり4枚を超えて使用しないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かしてから使用してください。

成分・分量

膏体100g中に次の成分を含んでいます。
 ロキソプロフェンナトリウム水合物…8.1g(無水物として7.14g)
 L-メントール…3.5g
 トコフェロール酢酸エステル…2.3g
 添加物として脂環族飽和炭化水素樹脂、水添ジシロキシリンエステル、ステレン・イソブレン・スチレンブロック重合体、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチェックを閉めて保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべくすみやかに使用してください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記
にお願ひいたします。

株式会社大石膏盛堂 電話 (0942) 83-2112
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

