

## 第2類医薬品

ここを押して  
開けてください

ご使用に際して、この説明書を  
必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように  
大切に保管してください。



# ロキプロチャージLXテープα

## 特長

- すぐれた鎮痛消炎効果のあるロキソプロフェナトリウム水和物を8.1%配合。
- ロキソプロフェナトリウム水和物が皮膚から吸収され、変化しない活性体が直接痛みに効きます。

### ⚠(使用上の注意)

#### ❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。

#### 2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) しっしん、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし、たむし等又は化膿している患部。

#### 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください

#### 4. 連続して2週間以上使用しないでください (本剤は痛みを一時的におさえるもので、痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)

#### 🗨️相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 高齢者
- (5) 次の診断を受けた人  
気管支ぜんそく

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありしますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

またに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれます。

#### 3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (下痢・軟便)

#### 4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (他の疾患の可能性があり)

## 効能・効果

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)

## 用法・用量

表面のライナーをはがし、1日1回患部に貼付してください。

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 1日あたり4枚を超えて使用しないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

## 成分・分量

膏体100g中に次の成分を含んでいます。  
ロキソプロフェナトリウム水和物…8.1g (無水物として7.14g)  
L-メントール…3.5g  
トコフェロール酢酸エステル…2.3g  
添加物として脂環族飽和炭化水素樹脂、水添ロジンジリセリンエステル、ステレン-インプレックスレンブロック共重合体、ポリソチレン、流動パラフィン、その他1成分

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気のない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手が届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべくすみやかに使用してください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社大石膏盛堂 電話 (0942) 83-2112  
受付時間 午前9:00～午後5:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



製造販売元

株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

〈実物大〉

10 cm

7 cm