

驅風解毒散エキス〔細粒〕79〔満量〕



● 使用上の注意 ●



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4)胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5)高齢者
- (6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (7)次の症状のある人 むくみ
- (8)次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効能・効果 ●

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症：

扁桃炎、扁桃周囲炎

● 用法・用量 ●

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて、うがいしながら少しずつゆっくり服用してください。

(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は熱ければ冷ましてうがいしながら少しずつゆっくり飲んでください。
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●		本品3包(6.9g)中	
ボウフウ	3g	レンギョウ	5g
ケイガイ	1.5g	ゴボウシ	3g
キョウカツ	1.5g	キキョウ	3g
カンゾウ	1.5g	セッコウ	10g

上記より製した駆風解毒散乾燥エキス〔満量〕6.0gを含有する細粒剤です。添加物としてデキストリン、ヒプロメロー
ス、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乳糖水和物、バレিশヨデンブンを含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は生薬を原料としていますので、製品により若干色調が異なる場合がありますが、効果に変わりありません。
- (5)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口
TEL (052)883-5172 受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

 松浦薬業株式会社
愛知県名古屋市昭和区円上町24-21