

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください  
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

はちみじおうがん  
**八味地黄丸錠「至聖」**

漢方製剤

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

- (1)胃腸の弱い人。
- (2)下痢しやすい人。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

裏面の用法・用量、効能・効果、成分・分量、保管及び取り扱い上の注意も必ず読んでください

## 【効能・効果】

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少または多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

## 【用法・用量】

次の量を食前または食間に水又は白湯で服用する。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15才以上)	4 錠	3 回
7才以上15才未満	3 錠	
5才以上7才未満	2 錠	
5才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

〈用法・用量に関連する注意〉

5才以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 【成分・分量】

1日量（12錠）中

成 分 名	分 量	成 分 名	分 量
ジオウ末	1067mg	ブクリヨウ末	534mg
サンシュユ末	534mg	ボタンピ末	534mg
サンヤク末	534mg	ケイヒ末	177mg
タクシャ末	534mg	ブシ末	87mg

添加物：メタケイ酸アルミン酸Mg、デンプングリコール酸Na、ショ糖脂肪酸エステル、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）を含有

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- ぬれた手で本剤に触れないこと。（水分が錠剤につくと、変色の原因になる。）



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話番号076-472-1011 受付時間9:00～16:30（土、日、祝日を除く）