カイゲントローチS

販売名:トローチS

指定医薬部外品

使用に際しては、説明書きをよくお読みください。

24錠

効能・効果

●のどの炎症による次の症状:のどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・声がれ・のどの不快感●口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

成分・分量 1錠(1.2g)中

セチルピリジニウム塩化物水和物　1mg
キキョウエキス25mg(原生薬換算量:100mg)

添加物:精製白糖、粉末還元麦芽糖水アメ、ゼラチン、アラビアゴム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸カルシウム、パラオキシ安息香酸ブチル、黄色5号、l−メントール、香料

用法・用量

次の1回量を、口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
5歳以上	1錠	6回	2時間以上
5歳未満の乳幼児	✕使用しないこと		

⚠使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)本剤はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。(4)本剤は5歳未満の乳幼児には使用させないでください。
(5)トローチ剤の取り出し方
右図のようにトローチ剤の入っているPTPシート凸部を指先で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなどの思わぬ事故につながります。)

PTPシート取り出し図

発　売　元　**カイゲンファーマ株式会社**
大阪市中央区道修町二丁目5番14号
お客様相談室 ☎06-6202-8911
受付 9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元　**日新薬品工業株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

紙