

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

販売名:キュアレアドライ  
外皮用薬 第2類医薬品  
Medicine for Dry Skin

**⚠ 使用上の注意** **⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の人は使用しないこと (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病等)の人 (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある) (3) アトピー性皮膚炎の人(軽い症状であっても医師の下で適切な治療を受ける必要がある) **☞ 相談すること** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 潤滑やただれのひどい人 (4) 医師からアトピー性皮膚炎と診断されたことのある人 2. 使用後、次の症状があらわれた場合 

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

は副作用の可能性があるため、直ちに使用中を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用中を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**効能・効果** 手指の荒れ、ひじ・

ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんご後のはれ・筋肉痛・関節痛

**用法・用量** 1日1~数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼ってください

<用法・用量に関連する注意> (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (2) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (3) 外用にのみ使用すること

**成分・分量** 100g中

ヘパリン類似物質 0.3g、ジフェンヒドラミン 0.5g、ガンマ-オリザノール 1.0g、添加物として、ワセリン、スクワラン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチルポリシロキサン、1,3-ブチレンジグリコール、プロピレングリコール、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N'-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド<sup>※</sup>、セタノール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、エデト酸Na、パラベン、2,2',2''-トリロトリエタノール、pH調節剤を含有する

**保管及び取扱い上の注意**

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 火気に近づけないこと ●衣類に付着すると、まれに黄ばみを生じることがあるので注意すること

あつたら  
いいな  
をカチにする  
小林製薬

製品のお問合せ  
は、お買い求め  
のお店又はお客  
様相談室にお願  
いいたします

MADE IN JAPAN

発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室  
0120-5884-01  
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931