

かゆみかきこわし

38歳

第3類医薬品

ムヒバッチA1

かゆみかきこわし

A202

販売名 ムヒバッチA1

第3類医薬品

鎮痒消炎剤

使用に際して、このケースをよく読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと

傷口、潰瘍、かきこわし、ただれ、かぶれ、目の周囲、粘膜、顔

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースをもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースをもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 ☎076-472-0911
(電話受付時間：月~金(祝日を除く)9:00~17:00)

本剤にステロイド成分は配合されていません



税 控除 対象

発売元 **muhi**

製造販売元

株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地
株式会社 大石膏盛堂
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

使用期限(年、月)

製造番号

効能 虫さされ、かゆみ、しもやけ

用法・用量 バッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。使用開始目安年齢1才以上。(2) 外用にのみ使用し、内服しないこと。(3) 1回の使用は4~5時間を目安とし、同じ場所に長時間の使用はさけること。皮ふの強い方は、本剤を同じ場所に続けて使用しないこと。まれに貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがある。(4) 汗をかいたり、皮ふがぬれている時は、よくふき取ってから使用すること。

有効成分 膏体100g中

ジフェニドラミン(かゆみ止め成分) 1.0g / イソプロピルメチルフェ

ノール(殺菌剤) 1.0g / メントール(清涼感剤) 3.0g

添加物として脂肪酸飽和炭化水素樹脂、流動パラフィン、水添ロジン、グリセリンエステル、ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、無水ケイ酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2) 小児の手のとどかない所に保管すること。(3) 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4) 開封後はアルミ袋を折り線で2回折りまげて保管し、使用期限内であっても、なるべく早く使用すること。(5) 使用期限(ケース及びアルミ袋に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

包装 38枚入(直径2.8cm)

登録商標

開き口

かゆみどめ

76枚
38枚×2袋

第3類
医薬品

ムヒパッチA1

虫さされかゆみに

AA02

販売名 ムヒパッチA1

第3類医薬品

鎮痒消炎剤

効能 虫さされ、かゆみ、しもやけ

使用に際して、このケースをよく読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

用法・用量 パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼付してください。
〈用法・用量に関連する注意〉

使用上の注意
△ 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる

× (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
傷口、溼潤、かきこわし、ただれ、かぶれ、目の周囲、粘膜、顔

相談すること
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースをもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースをもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 ☎ 076-472-0911
(電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00)

本剤にステロイド成分は配合されていません

税控除対象



発売元 **muhi**

製造販売元

株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地
株式会社 大石膏盛堂
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

使用期限(年、月)

製造番号

有効成分 膏体100g中
ジフェニヒドラミン(かゆみ止め成分) 1.0g / イソプロピルメチルフェニール(殺菌剤) 1.0g / メンソール(清凉感剤) 3.0g
添加物として脂質族飽和炭化水素樹脂、流動パラフィン、水添ロジン、グリセリンエステル、スチレン/イソブレン/スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、無水ケイ酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2) 小児の手のとどかない所に保管すること。(3) 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になりたり品質が変わる)。(4) 開封後はアルミ袋を折り線で2回折りまげて保管し、使用期限内であっても、なるべく早く使用すること。(5) 使用期限(ケース及びアルミ袋に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

包装 76枚入(直径2.8cm)

登録商標

開き口