

# 肩こり・腰痛 筋肉痛



この外箱は製品とともに保管し、使用の際には必ずお読みください。  
販売名：コリパット（外用鎮痛消炎薬） 第3類医薬品

**使用上の注意**

❌ **してはいけないこと**  
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）  
1. 次の人は使用しないこと  
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
2. 次の部位には使用しないこと  
①目の周囲、粘膜等。②湿疹、かぶれ、傷口。

⚠️ **相談すること**  
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**効能又は効果** 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

**成分及び分量 膏体100g中**

d-カンフル	1.243g
サリチル酸メチル	6.215g
ハッカ油	0.829g
メントール	3.108g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.345g

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、チルベン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。

**用法及び用量**  
1日1～2回ライナーをはかき、患部に貼ってください。  
〔用法及び用量に関連する注意〕  
(1)用法及び用量を厳守してください。  
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。  
(3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。  
(4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。  
(5)皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

**保管及び取扱上の注意**  
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります）。  
(4)開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。  
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先  
大協薬品工業株式会社  
お客様相談窓口 電話 076-479-1313  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 大協薬品工業株式会社  
富山市水産部寺173

第3類医薬品 140枚入  
鎮痛消炎プラスタールコリパット  
サイズ:6.2cm×4.2cm

# 肩こり・腰痛 筋肉痛

ムレにくい  
穴あき  
タイプ

ビタミンE配合

痛みに浸透!

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

ビタミンE配合 140枚入  
サイズ:6.2cm×4.2cm

# 肩こり・腰痛 筋肉痛

ムレにくい  
穴あき  
タイプ

第3類医薬品 140枚入  
鎮痛消炎プラスタールコリパット  
サイズ:6.2cm×4.2cm

# 肩こり・腰痛 筋肉痛

ムレにくい  
穴あき  
タイプ

ビタミンE配合

痛みに浸透!

セルフメディケーション  
税控除対象

鎮痛消炎プラスタール

製造番号  
使用期限

保存袋付

紙

4 940794 443699

第3類医薬品 140枚入  
鎮痛消炎プラスタールコリパット  
サイズ:6.2cm×4.2cm

# 肩こり・腰痛 筋肉痛

ムレにくい  
穴あき  
タイプ

痛みに浸透!

鎮痛消炎プラスタール

製造番号  
使用期限

保存袋付

紙

4 940794 443699

TA90-79Y KニT1A90-79YB

0072-342Z