【胃腸薬】

フラーリン。J粒deux

第3類医薬品

- ◆ フラーリン J ** pdeux は健胃の効果を中心に、胃腸に働くよう考えられた生薬配合の健胃薬です。
- ◆ フラーリン J 粒deux中のショウキョウ・ニンジン・ケイヒ・オウレン・カンゾウ・牛胆は胃腸の機能を調整し、また牛胆はコウボク・ビャクジュツとともに胃から生じる症状を和らげ、ボレイをはじめ、酸化マグネシウム・炭酸水素ナトリウム・沈降炭酸カルシウムは胃液の状態を整えるように作用します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5) 次の診断を受けた人。 腎臓病、甲状腺機能障害
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、 この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘、下痢
- 4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、 薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気a)、悪心)、嘔吐

a) 嘔気: はきけのことを示します。

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1 回量		1 口眼田同粉	
	容器入りの場合	分包品の場合	1日服用回数	
成人(15歳以上)	1.5g(添付のサジ1杯)	1包		
11歳以上15歳未満	成人の2/3の量(1.00 g)	2/3包		
8歳以上11歳未満	成人の1/2の量(0.75 g)	1/2包	3 回	
5歳以上 8歳未満	成人の1/3の量(0.50 g)	1/3包		
1歳以上 5歳未満	成人の1/4の量(0.375g)	1/4包		
1歳未満	服用しないこと			

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤4.5g又は3包中

ニンジンエキス末……150mgコ ウ ボ ク 末……150mgビャクジュツエキス末……111mgショウキョウ末……75mg牛 胆 汁 エ キ ス 末……100mgボ レ イ 末……100mgオ ウ レ ン 末……120mg酸化マグネシウム……75mgカ ン ゾ ウ 末……150mg炭酸水素ナトリウム……500mgケ イ ヒ 末……100mg沈降炭酸カルシウム……150mg

添加物として結晶セルロース、デキストリン、バレイショデンプンを含有する。

- ・本剤は淡褐色で、特異なにおいを有し、味は苦い顆粒剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、 効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、 2日以内に服用すること。

フラーリン J 粒deux は生薬の特性を活かした生薬配合製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬配合製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

- お問い合わせ先 —

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、 又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表) 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号