

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

第3類医薬品

目ぐすり 13ml

# 新・ロート子どもソフト

それは、たいせつなお子さまの目をまもる  
「しみないタイプの目ぐすり」

## キャップの開閉方法

### キャップの開け方

キャップを手前にひねってください。



### キャップの閉め方

カチッと音がするまで押し下けてください。



\*容器全体を支えるように持ち、キャップを上にして開閉してください。  
容器の中央部分だけを持って開閉すると、薬液がとびだしてしまることがあります。

- デリケートなお子さまの目をいたわりながら、抗ヒスタミン作用を持つクロルフェニラミンマレイン酸塩配合で、目のかゆみや炎症を穏やかにしめます。
- ゴミやほこり・花粉などの異物を取り除いて、眼病を予防します。
- カルキを中和するタウリン配合で、水泳後の目の塩素刺激をやさしく緩和します。
- 無着色・無香料・非刺激性の目薬で、四ヶ月のお子さまからお使いいただけます。

子どもの目の機能は6歳頃でほぼ完成することをご存知ですか？

でも、まだ未熟な面もあって

いつもは元気な子も、かぜをひいたときや体力が落ちている時などにはウイルスや細菌、ほこりに負けじて目に炎症を起こしたり、目やにが多くなることがあります。

上手なめぐすりのさしかた

子どもの目のまわりをふいてから目頭に目薬を2~3滴おとしてまばたかせると自然に液が目に入ります。

でも、じょうずには伝えられなくて

ゴミやほこりが目に入ってしまっても、痛みやムズムズ感を伝えられず、つい手でこすってしまうのが真っ赤に…。  
小さなほこりが原因で思わずトラブルを引き起こすなんてことも。



ティッシュなどで目のまわりをふいた後、軽く目頭を押さえて、1分程度を閉じているのが効果的です。

## ⚠ 使用上の注意

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人：緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持つ

て医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

## 効能・効果

眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、結膜充血、目のかゆみ、目の疲れ、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)

## 有効成分

アミノエチルスルホン酸(タウリン)  
配合量:1%

ブルの消毒剤(カルキ)による目の刺激を緩和して、眼病を予防します。

クロルフェニラミンマレイン酸塩  
配合量:0.01%

充血や目のかゆみをきちんと鎮めます。

イブシロン-アミノカプロン酸  
配合量:1%

目の炎症を鎮めます。

L-アスパラギン酸カリウム  
配合量:0.2%

目の細胞呼吸を活発にして目の疲れを癒します。

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ベンザルコニウム塩化物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有します。

## 用法・用量

15才未満:1回2~3滴、1日5~6回点眼してください。

## 用法・用量に関する注意

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

なお、小さなお子さま(4ヶ月以上)にもご使用いただけます。

(2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。

〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕

また、混濁したものは使用しないでください。

(3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。  
(4) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先と  
目やまぶたが  
ふれることの  
ないように

## 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4) 他の人と共用しないでください。

(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、

使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

(6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用ください。

(7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

(8) 誤用をさけるため、使用済みの空容器は捨ててください。

## お問い合わせ先:お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを  
お聞かせいただけませんか、「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京: 03-5442-6020 大阪: 06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

400611704