

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要なときに読めるように大切に保管すること。

眼科薬

つらい疲れ目に

# マイティア<sup>®</sup> ピントケア40メディカルマイルド

第3類医薬品

販売名 マイティアピントケア40メディカルマイルド

## 特 徵

- 2つのピント調節機能改善成分シアノコバラミン(ビタミンB12)とネオスチグミンメチル硫酸塩を最大濃度※配合。
- 目のかゆみや充血を抑える抗ヒスタミン成分クロルフェニラミンマレイン酸塩、角膜の修復などを助けるタウリン、角膜を保護するコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを配合。
- 「目がショボショボする」、「視界がぼやける」などのつらい疲れ目に効果を発揮する目薬です。
- やさしいさし心地の目薬です。

※一般用眼科用薬製造販売承認基準内

【承認基準とは】厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲のこと

## △ 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- 医師の治療を受けている人。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の症状のある人。  
　　はげしい目の痛み
- 次の診断を受けた人。  
　　緑内障

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

#### 3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- 目のかすみが改善されない場合。
- 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

## 効 能

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

## 用法・用量

1回2～3滴を1日5～6回点眼してください。

### 〈用法・用量に関する注意〉

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

(2)容器の先を目、まぶた、まつ毛に触れさせないこと(目にやにやその他異物等が混入することで、薬液が汚染あるいは混濁することがある。)。また、混濁したものは使用しないこと。

(3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。

(4)点眼用にのみ使用すること。

(5)用法・用量を厳守すること。



容器の先が目、まぶた、まつ毛に  
ふれないように

## 成 分 1mL中

成 分	含 量
シアノコバラミン(ビタミンB12)	0.2mg
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.05mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.3mg

成 分	含 量
タウリン	1mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5mg

添加物：ホウ酸、ホウ砂、ヒプロメロース、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、l-メントール、pH調節剤

## 保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらぬ涼しい所に密栓して保管すること。特に自動車内や暖房器具の近くなど、高温となるおそれのある場所に放置しないこと。

(2)小児の手の届かない所に保管すること。

(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)。

(4)容器に他のものを入れて使用しないこと。


(5)他の人と共用しないこと。

(6)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

また、使用期限内であっても、内袋開封後はすみやかに使用すること。

(7)保存の状態によっては、容器の先周囲やキャップの内側に薬液中の成分の結晶が付くことがある。このような場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用すること。

(8)本剤は、赤色の目薬であるため、衣服などにつかないように注意すること(もし、衣服などについたときには、すぐに水で洗い落とすこと。)。



## 容 量 15mL

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申しあげます。

千寿製薬株式会社「お客様インフォメーション」

〒541-0048 大阪市中央区瓦町三丁目1番9号

電話 0120-078-552 受付時間：9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 SENJU 千寿製薬株式会社  
大阪市中央区瓦町三丁目1番9号

販売提携 第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋3-14-10