

袋のフチ部のお取り扱いにご注意ください ★ ◀ この部分を持ってお開けください

コルゲンコーワ 滋養チャージ

指定医薬部外品

服用に際しては、この袋をよくお読みください

100mL

【使用上の注意】 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性
がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹等

2. しばらく服用しても症状がよくなり
ない場合は服用を中止し、この製品を
持って医師、薬剤師又は登録販売者に
相談してください

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 高温をさけ、直射
日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児
の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器
に入れ替えないでください(誤用の原因になったり
品質が変わります。)(4) 凍結させないでください。
(5) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

【効能・効果】 ● 病中病後の体力低下時、発熱を伴う
消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前
産後等の栄養補給 ● 体力、身体抵抗力又は集中力の
維持・改善 ● 疲労の回復・予防 ● 虚弱体質(加齢
による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防
● 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・
予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が
重い・身体がだるい、冷えやすい・血行が悪い

【用法・用量】 成人(15歳以上) 1回1袋、1日1回服用して
ください。(用法・用量に関連する注意) 用法・用量を
守ってください(他のビタミン等を含む製品を同時
に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

【成分・分量】 (100mL中)
ケイヒ流エキス 0.15mL(ケイヒとして
150mg)、ジャクヤクエキス 20mg(ジャク
ヤクとして 80mg)、ショウキョウ流エキス
0.6mL(ショウキョウとして 600mg)、チンピ
エキス 6mg(チンピとして 30mg)、ニンジン
乾燥エキス 67mg(ニンジンとして 1000mg)、
ローヤルゼリー抽出液 0.15mL(ローヤル
ゼリーとして 100mg)、リポフラビンリン酸
エステルナトリウム 15mg[リポフラビン
(V.B₂)として11.8mg]、ピリドキシン塩酸
塩(V.B₆) 10mg、ニコチン酸アミド 20mg
〔添加物〕アメ、白糖、果糖ブドウ糖液糖、
D-ソルビトール、ブドウ糖、デキストリン、
DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、
エタノール、l-メントール、カンテン、ロー
カストピーンガム、キサンタンガム、香料、
グリセリン、プロピレングリコール
(アルコール0.47mL以下)

〈成分・分量に関連する注意〉ビタミンB₂
(リポフラビンリン酸エステルナトリウム)
により、尿が黄色になることがあります。

製造販売元

興和株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14



キャップ: PE
袋: PE, 金属

お問い合わせ先 興和(株) お客様相談センター
03-3279-7755 月～金(祝日を除く) 9:00～17:00

使用期限

製造番号 / 識別番号

A22HH