

ラクナールGプラス
販売名：ラクナールGプラス

開け口

30mL×3 第2類医薬品

【成分・分量】1日量(30mL×2)中

タウリン 2000mg、カンゾウエキス 1000mg(原生薬カンゾウとして 4000mg)、ショウキョウ流エキス 1mL(原生薬ショウキョウとして 1000mg)、ニンジンエキス 60mg(原生薬ニンジンとして 666mg)、ビロキシン塩酸塩(ヒタマシ) 50mg、バンテール 30mg、添加物：白糖、果糖、アセシルアムル、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料、アルコール0.3mL以下(30mL中)

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上) 1回1瓶(30mL)を1日2回服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。○用法・用量を厳守すること。○15歳未満の小児は服用しないこと。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
※本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

発売元  **天野商事株式会社**
名古屋市東区丸の内3丁目13番12号

製造販売元  **中外医薬生産株式会社**
三島興中街市砂のが丘7-5-5

お客様相談室：0595-21-3200
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

△使用上の注意

⊗「してはいけないこと」

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)


長期連用しないこと

■(相談すること)

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。むくみ(4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。	
症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパシー	手足のたるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3.5～6日間服用しても症状がよくなる場合、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



かぜなどの発熱で体がだるい

食欲がない そんな時の

栄養補給に

ラクナールGプラス
30mL×3 第2類医薬品

かぜなどの
発熱で体がだるい
食欲がない

そんな時の
栄養補給に


ニンジン
エキス

カンゾウ
エキス

ショウキョウ
エキス

タウリン
2000mg
(60mL中)

第2類医薬品 **ラクナールGプラス**



かぜなどの
発熱で体がだるい
食欲がない

そんな時の
栄養補給に

ニンジン
エキス

カンゾウ
エキス

ショウキョウ
エキス

タウリン
2000mg
(60mL中)

ラクナールGプラス
第2類医薬品 30mL
1日2回服用
30mL×3



発熱で
体がだるい



食欲不振

そんな時の
栄養補給に



4 987006 250324



ガラス：ビン
金 属：キャップ

01RGECAM