



てんらい清心錠

360錠

第2類医薬品

ここからお切りください。

使用前にこの袋の説明書を必ずお読みください

漢方製剤 加味逍遙散 第2類医薬品

開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。

販売名：てんらい清心錠
360錠 30日分 ※成人(15歳以上の場合)

使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 胃腸の弱い人。
(4) 高齢者。
(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
むくみ
(7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに次の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
アルドステロン症 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症※、不眠症
※血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【用法・用量】1日3回、食前又は食間※に水又は白湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

※食間とは、食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後のことである。

【成分・分量】1日量(12錠中)加味逍遙散エキス(3/5量)2.28gを含有
トウキ・1.8g シャクヤク・1.8g ソウジュツ・1.8g プクリョウ・1.8g サイコ・1.8g ボタンビ・1.2g
サンシシ・1.2g カンゾウ・1.2g ショウキョウ・0.6g ハッカ・0.6g より抽出
添加物：無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)。 (4) 本剤は、生薬成分を配合しているため、製品により若干色調が異なることがあるが、効能には変わらない。(5) 水分が錠剤につくと、内容成分の変化の原因となるので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないこと。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(7) 袋のチャックは湿気などを避けるために使用のつどしっかり閉めること。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 お客様相談室
☎0120-53-3451 平日9:00～17:00

製造販売元

明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地



(上段)使用期限(西暦年、月)/(下段)製造番号

袋 24・4・A