

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

デリケートな部位のかゆみ、かぶれに

# フルーツ<sup>®</sup>Mプラス

第2類医薬品 鎮痒消炎剤

## 製品特長

- 7つの有効成分（抗ヒスタミン剤：ジフェンヒドラミン、抗炎症剤：グリチルレチン酸、殺菌剤：イソプロピルメチルフェノール、局所麻酔剤：リドカイン、局所冷感刺激剤：*l*-メントール、血流改善剤：トコフェロール酢酸エステル、代謝促進：パンテノール）をバランスよく配合した鎮痒消炎剤です。
- 爽やかな清涼感で患部のかゆみを和らげます。
- 親水性のクリームですので、のびがよく、べとつきません。

本剤にステロイド成分は配合されておりません。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

カンジダ症、トリコモナス症等の原因によるかゆみは本剤で治療できません。医師による治療が必要になります。

(裏面もご覧ください。)

## 【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

## 【成分・分量】 (100g中)

成分	分量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみを鎮めます。
グリチルレチン酸	1.0g	患部の炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用で、雑菌の繁殖を抑えます。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用でかゆみを和らげます。
ℓ-メントール	0.5g	爽やかな清涼感でかゆみを和らげます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を促進し、治療を助けます。
パンテノール	1.0g	荒れた皮ふを正常にすることを助けます。

添加物として、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ミリスチン酸オクチルドデシル、イソステアリン酸、ステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、1,3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、エドト酸ナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸メチルを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限(ケース及びチューブに表示)を過ぎた製品は使用しないでください。

## 【お問い合わせ先】

新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室

TEL: 076-435-0878

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【製造販売元】新新薬品工業株式会社 富山県富山市今市324番地