

箱内側及び外側の説明書きを必ずお読みください

# なみだロートファイブ®

LUBRICANT EYE DROPS

**5**本入り  
(1本4mL)

販売名: なみだロートファイブ 第3類医薬品 目薬 副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

なみだに近い処方ですやさしく瞳をうるおす

## なみだロート®ファイブ

防腐剤  
無添加\*

4mL×**5**本入り

裸眼でも  
コンタクトでも



人工涙液型点眼薬

開栓後、14日を過ぎたものは使用しないでください

\*防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合しておりません

第3類医薬品 目の乾き・疲れに

↑ ② 内側をお読みください ↑

上段: 使用期限(未開封時)  
下段: 製造番号

お問合せ先  
コミュニケーションコール  
**0120-610-755**

ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

紙 携帯袋は  
付いていません

R·eco 本製品には、  
環境に配慮した  
資材を使用しています。  
ココロもカラダも  
地球も健康に

▲ 有効成分・添加物・効果・用法・用量 ▲

【有効成分】 塩化カリウム0.1%、塩化ナトリウム0.4%  
【添加物】 ホウ酸、pH調節剤  
【効能・効果】 ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)  
【用法・用量】 1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

乾いた瞳、ゴロゴロ不快な瞳に  
なみだに近い処方  
うるおいを

瞳にしみない  
やさしい  
さし心地

防腐剤  
無添加\*

小さな  
お子さまにも\*

人工涙液型点眼薬

開栓後、14日を過ぎたものは  
使用しないでください

↑  
① 押してあける

清涼感レベル



裸眼時と、すべてのコンタクトレンズ  
装着中に使えます

コンタクトレンズは眼科医の処方・定期検査を受けて使用すること

裸眼

ハード  
O<sub>2</sub>(酸素透過性)  
レンズを含む

ソフト  
使い捨てを含む

カラーコンタクト  
サークルレンズを含む

\* 防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません \*1歳以上

【ご注意】1.次の方は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)次の症状のある人:はげしい目の痛み (4)次の診断を受けた人:緑内障 2.使用に際しては、箱の内側及び外側の説明書きをよくお読みください。3.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

使用前に、この箱内側及び外側の説明書きを必ずお読み  
ください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

販売名：なみだロートファイブ

第3類医薬品 目薬

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み (4) 次の診断を受けた人…緑内障
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 目のかすみが改善されない場合 (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

**用法・用量** 1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。

● **用法・用量に関する注意** (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。[汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないこと。(3) 点眼用にのみ使用すること。(4) コンタクトレンズを装着していないときも使用できる。(5) 開栓後、14日を過ぎたものは使用しないこと。

**保管及び取扱い上の注意** (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないこと。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 他の人と共用しないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後はなるべく早く使用し、開栓後、14日を過ぎたものは使用しないこと。(6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用すること。(7) 容器に他の物を入れて使用しないこと。