

TOPIC TROCHE

トピックトローチW

指定医薬部外品

5才から
服用できる

のどの痛み・はれ ・口内の殺菌・消毒に



Wの生薬で炎症を抑える

カンゾウ乾燥エキス
キキョウエキス

殺菌

デカリニウム塩化物

メントール不使用

24錠
バナナ味



「トローチのよくあるQ&A」



MADE IN JAPAN

製造販売元 日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

お問い合わせ先 ☎ 0120-415-688

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)



使用期限 製造番号



販売名：トピックトローチW

口腔咽喉薬 指定医薬部外品

使用に際しては、説明書きをよくお読みください。

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体质の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください


- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 本剤はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。
- (4) 本剤は5歳未満の乳幼児には使用させないでください。
- (5) トローチ剤の取り出し方
右図のようにトローチ剤の入っているPTPシート凸部を指先で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなどの思わぬ事故につながります。)



【成分・分量】6錠(7200mg)中

成 分	分 量
デカリニウム塩化物	0.75mg
キキョウエキス(原生薬換算量)	50mg(200mg)
カンゾウ乾燥エキス(原生薬換算量)	50mg(250mg)

添加物：精製白糖、粉末還元麦芽糖水アメ、軽質無水ケイ酸、アラビアゴム末、ゼラチン、バラオキシ安息香酸ブチル、黄色5号、ステアリン酸カルシウム、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 本剤は吸湿性を持っています。アルミ袋を開封し、日数を経ると、湿気の多いときは、変色することがあります。ご使用の残りは、特に湿気に注意し、変色したものは使用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【効能・効果】

- 口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去
- のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

【用法・用量】

次の1回量を、口中に含み、かますにゆっくり溶かしてください。

年 齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
5歳以上	1錠	5~6回	2時間以上
5歳未満の乳幼児	使用しないでください		