

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

つらい目の疲れ、肩こり、腰痛、手足のしびれ

メコバラミン主剤

ロスミンSプラス

活性型ビタミンB₁₂ 配合

特 徴

慢性的な肩こりや腰痛、手足のしびれは硬くなった筋肉に圧迫されたりして、末梢神経が傷つくことで起こることがあります。

ロスミンSプラスは末梢神経修復に関与する活性型ビタミンB₁₂のメコバラミンと葉酸、筋肉のコリの原因になる疲労物質の蓄積を防ぐビタミンB₁誘導体のフルスルチアミンや天然型ビタミンE、ビタミンB₆、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、自律神経の働きを助けるガンマーオリザノールを配合していますので、肩こり、腰痛、手足のしびれや眼精疲労などを緩和します。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】

次の人は服用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相 談 す る こ と

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

医師の治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、胃部不快感
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

軟便、下痢、便秘

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

● 次の諸症状の緩和：

神経痛、筋肉痛・関節痛（肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労（慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み）

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

▼裏面もお読みください

用法・用量

次の1回量を食後に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	1錠	1日3回
15才未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞
定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量 3錠中

は た ら き	成 分	分 量
末梢神経を正常な状態にして、神経痛、肩こり、腰痛、手足のしびれを緩和します	メコバラミン（活性型ビタミンB ₁₂ ） 葉酸	1,500μg 5mg
末梢血行を改善し、肩こり、腰痛、手足のしびれを緩和します	コハク酸d-α-トコフェロール（天然型ビタミンE）	100mg
エネルギーの産生に重要な成分で神経や筋肉の機能を保つ働きがあります	フルスルチアミン塩酸塩（ビタミンB ₁ 誘導体） [フルスルチアミンとして100mg]	109.16mg
神経系を正常に働かせます	ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	100mg
筋肉や神経組織に必要なエネルギーの産生を促します	ニコチン酸アミド	60mg
ビタミンの一種でエネルギー産生に働きます	パントテン酸カルシウム	30mg
自律神経の働きを助けます	ガンマーオリザノール	10mg

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖水和物、マクロゴール、ゼラチン、タルク、炭酸Ca、乳酸Ca水和物、ケイ酸Ca、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、アラビアゴム、白糖、酸化チタン、カルナウバロウ、カルメロースNa

保管及び取扱い上の注意

- (1) 箱に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。（本剤は光に対して不安定です。）
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 本剤は落下などの衝撃で錠剤が破損することがありますので、取扱いにはご注意ください。
- (5) 湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (6) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。開封時に捨ててください。
- (7) 箱の「開封年月日」記入欄にピンを開封した日付を記入しておいてください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (9) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6562-7411 受付時間 10:00～17:00（土、日、祝日を除く）



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2