

**内服 ボラギノール®EX**

効果・効能:次の場合の症状の緩和・痔核(いぼ痔)・痔瘡・痔出血  
用法・用量:次の量を食後に水又はぬるま湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人 (15歳以上)	3錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>  
用法:用量を厳守すること。  
成分・分量:  
9錠(2.7g)中以下エキス1.5g.  
オウバク0.30g、カンゾウ0.95g、  
コウカ1.35g、サイゴ1.35g、  
ショウマ1.35g、ソウジュツ2.0g、  
ダイオウ0.35g、チンピ0.50g、  
トウキ0.675g、トウニン0.675g  
添加物:軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ツワロコシテンブン乳糖、ヒドロキシプロリセルロース

△ 使用上の注意  
**【してはいけないこと】**  
 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りますくなる)  
 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること  
**【相談すること】**  
 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
 (1) 医師の治療を受けている人。  
 (2) 痔漏又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。(5) 高齢者。(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7) 次の症状のある人。下痢(8) 次の医薬品を服用している人。渴下薬(下剤)  
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位 症状  
 皮膚 発疹、発赤、かゆみ  
 食欲不振、吐き気、嘔吐、ほげしい腹痛を伴う下痢、腹痛  
 消化器

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。軟便、下痢4.1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
 5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない温かい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(4) 包装を破損しないこと。(5) 包装を傷つけないこと。(6) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

製造番号  
 使用期限

本剤は天然の生薬を原薬としていますので、多少色調が異なることがありますか、効果に変わりはありません。

この箱は本剤とともに保管し、服用の際によくお読みください。

**内服 ボラギノール®EX**

第2類医薬品

45錠

痔の原因となる 血流を改善

10種類の生薬配合

**内服 ボラギノール®EX**

痔の原因となる 血流を改善

10種類の生薬配合

痔の症状を緩和

BORRAGINOL EX ORAL is hemorrhoidal preparation containing 10 types of crude drug extract.

45錠 第2類医薬品

天藤製薬お客様相談係 ☎0120-932-904  
受付時間 9:00~17:00(土、日、休、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

4 987978 101105

D2

10種類の生薬配合  
**内服  
ボラギノール®EX**  
痔の原因となる  
血流を改善

45錠  
第2類医薬品

製品について  
こちら

QRコード

販売元  
天藤製薬株式会社  
大阪府豊中市  
新千里東町一丁目5番3号  
製造販売元  
剤盛堂薬品株式会社  
和歌山市太田二丁目8番31号