

開け口

商品詳細へ



ジキナWのどスプレー

(口腔咽喉薬) 第3類医薬品

30mL

ご使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

▲ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
長期連用しないでください。

🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)口内にひどいただれのある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 使用后、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。口の刺激感
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気

効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量をお守りください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)のどや口内の患部の塗布用におのみ使用し、内服しないでください。(4)息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどや口内の患部に向けて、声を出しながら噴射してください。(5)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。

成分・分量 <100mL中>

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 0.02g

セチルピリジニウム塩化物水和物 0.3g

添加物：グリセリン、プロピレングリコール、還元麦芽糖水アメ、ポリソルベート80、エタノール、L-メントール、ハッカ油、クエン酸Na水和物 含有

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなる場合があります。
- 火気に近づけないでください。
- 薬液が衣類に付着した時は、すぐに水又は洗剤で洗い落としてください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 本剤使用後の一定時間は、呼吸中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

お問い合わせ先

株式会社 富士薬品(学術室)

☎048-648-1118

9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元：株式会社 富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目3番38地



のどに直接、シュツと噴射

ジキナW[®] のどスプレー

のどの炎症による 痛み・はれ・声がれ

抗炎症成分 アズレンスルホン酸ナトリウム

殺菌成分 セチルピリジニウム塩化物




富士薬品

30mL

第3類医薬品


使用方法

- ①キャップを取りはずしてください。




- ②「アー」と声を出しながら患部に適量(目安として1～3回)噴射してください。

※初めてご使用の際は液が出るまで数回押してください。



- ③使用後は、キャップを元の位置にはめてください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



4 987524 060917