


【効能・効果】
急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による
次の諸症状の緩和・鼻づまり、鼻水（鼻汁過多）、く
しゃみ、頭重（頭が重い）
【用法・用量】
成人（15歳以上）及び7歳以上の小児：1回に1～2
度ずつ、1日1～5回、鼻腔内に噴霧してください。
なお、適用間隔は3時間以上おいてください。

使用方法



（液が残っている音はするが出ない時）
液を吸い上げるチューブは右図のよう
な構造になっています。
緩やかなカーブがついていますので容
器をかたむけずお使いいただくと、むだ
なくお使いいただけます。

容器断面図

※容器を横にして使用すると、薬液が霧状になりま
せんので、必ず上向きにして使用してください。
※使用後は先端部分を清潔なティッシュペーパー
等で拭き取り、キャップをしてください。
※ノズルの先端を針等で突くのは折れた時大変危
険ですのでおやめください。

《用法・用量に関連する注意》

1. 定められた用法・用量を守ってください。
2. 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こ
すことがあります。
3. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監
督のもとに使用させてください。
4. 点鼻用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量】（100mL中）

ナファゾリン塩酸塩……………50mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………500mg
リドカイン……………500mg
ベンゼトニウム塩化物……………20mg
グリチルリチン酸二カリウム……………300mg
添加物：グリセリン、エタノール、塩化Na、pH調節剤、
香料

第2類医薬品

販売名：モーテンα点鼻薬
鼻炎用点鼻薬

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼し
い所にキャップをして保管し
てください。
2. 小児の手の届かない所に保
管してください。
3. 他の容器に入れ替えないで
ください（誤用の原因にな
ったり品質が変わりま
す。）。
4. 他の人と共用しないでくだ
さい。
5. 使用期限を過ぎた製品は使
用しないでください。又、開
封後は期限内であっても品
質保持の点からなるべく早
くご使用ください。

副作用被害救済制度
（独）医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元
株式会社 雪の元本店
奈良県橿原市大谷町182番地

株式会社 雪の元本店 お客様相談室
電 話 0744-22-2440
受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00
（土、日、祝日を除く）



4 987487 104475

アレルギー性鼻炎、
急性鼻炎などの

鼻づまり・鼻水

モーテンα点鼻薬

第2類医薬品



セルフメディケーション
税 控除 対象

第2類医薬品

モーテンα点鼻薬 30mL

アレルギー性鼻炎、
急性鼻炎などの

鼻づまり 鼻水

ナファゾリン
塩酸塩配合

5つの有効成分配合

しみにくい、
液だれしにくい

患部に直接作用
定量噴霧スプレー

対象年齢 7歳以上



使用前にこの説明文書を必ずお読
みください。また必要な時に読める
よう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレル
ギー症状を起こしたことがある人。
2. 長期連用しないでください

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）薬などによりアレルギー症状を
起こしたことがある人。
（4）次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺
機能障害、緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は
副作用の可能性があるため、直ちに使
用を中止し、この文書を持って医師、薬
剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こるこ
とがあります。その場合は直ちに医
師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	使用後すぐに、皮膚の かゆみ、じんましん、声 のかすれ、くしゃみ、の どのかゆみ、息苦しさ、 動悸、意識の混濁等が あらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくなら
ない場合は使用を中止し、この文書
を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください

2401-AHI

製造番号 使用期限

