

【成分・分量】

1日分 2包(1包2.7g)中
竹茹温胆湯エキス……4.14g

日局 サイコ 3.0g、局外生規 チクジョ 3.0g、日局 プク リョウ 3.0g、日局 パクモン ドウ 3.0g、日局 ショウキョウ 1.0g、日局 ハンゲ 5.0g、日局 コウブシ 2.0g、日局 キキョウ 2.0g、日局 チンピ 2.0g、日局 キジツ 2.0g、日局 オウレン 1.0g、日局 カンゾウ 1.0g、日局 ニンジン 1.0g

添加物として乳糖水和物、合成ケイ酸アルミニウム、ヒドロキシプロピルセルロース、アセスルファミカリウム、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

〈成分・分量に関連する注意〉
本剤は、天然物(生薬)のエキスを
用いていますので顆粒の色が
多少異なることがあります。

使用
期限

製造
番号



竹茹温胆湯

第2類医薬品

Made in Japan

一日2包 14包入

製造販売元

新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

販売元

鶴松医薬株式会社
東京都港区赤坂2-21-5

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。
〈お問い合わせ先〉新生薬品工業株式会社 電話番号 0744-52-3330
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)



【効能・効果】体力中等度のものの次の諸症:かぜ、インフルエンザ、肺炎などの回復期に熱が長びいたり、また平熱になっても、気分がさっぱりせず、せきやたんが多くて安眠が出来ないもの

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。(5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返し残量を記載して保管し、2日以内に服用してください。

副作用被害救済制度の間合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
☎0120-149-931

販売名:
新生竹茹温胆湯顆粒2
〈満量処方〉

第2類医薬品

2.7g×14包入

【用法・用量】次の量を、1日2回朝夕、食前又は食間にそのまま水かお湯にて服用してください。

成人(15歳以上) ……1回1包 15歳未満7歳以上…1回2/3包
7歳未満4歳以上…1回1/2包 4歳未満2歳以上…1回1/3包
2歳未満……………服用しないでください

食間とは「食事と食事の間」のことで、前の食事から2~3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)高齢者。(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(5)次の症状のある人。むくみ(6)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	偽アルドステロン症、ミオパチー
症状	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	皮膚
症状	発疹・発赤、かゆみ