

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

痔の痛み・かゆみ・はれ・出血に

第②類医薬品

販売名: **ヘモスカットEX注入軟膏** **外用痔疾用薬**

＜製品の特徴＞

炎症を抑えるヒドロコルチゾン酢酸エステル、痛みやかゆみを鎮めるリドカイン、患部を保護する酸化亜鉛などの有効成分を配合した痔疾用の軟膏です。
肛門内には注入、肛門の外側には塗布の2通りの使用方法が可能ですので、患部に直接手を触れることなく衛生的にご使用いただけます。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果


きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

用法・用量

〔注入する場合〕

ノズル部分を肛門内に挿入し、全量を注入してください。


年 令	1回量	使用回数
成人(15才以上)	1個	1日1～2回
15才未満	使用しないこと	



〔塗布する場合〕

次の量を肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは注入には使用しないでください。

年 令	1回量	使用回数
成人(15才以上)	適量	1日1～2回
15才未満	使用しないこと	



※注入式のため、容器の中に薬剤が少量残りますが、残量を見込んで充填しています。

※寒い時期や低温で保管した場合、薬剤が硬くなることがありますが、手の中であたためると軟らかくなります。

《用法・用量に関連する注意》

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 肛門部にのみ使用してください。
3. 肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入してください。

成分・分量 1個(2.0g)中

成 分	分 量	作 用
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5.0mg	炎症を抑え、痛み・かゆみを鎮めます。
リドカイン	60.0mg	患部の痛み、かゆみを鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	50.0mg	血行を改善し、うっ血を防ぎます。
酸化亜鉛	100.0mg	患部を保護・止血し治癒を助けます。
アラントイン	20.0mg	患部の組織を修復し、傷の治りをはやめます。
ℓ-メントール	10.0mg	患部のかゆみを鎮めます。

添加物：サラシミツロウ、流動パラフィン、スクワラン、オリーブ油、ワセリン

【保管及び取扱い上の注意】

1. 高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 15才未満の小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。又、開封後は期限内であってもなるべく早く使用してください。
5. 使用済みの容器等はトイレに流さないでください。

発売元 **三井薬品株式会社**

東京都千代田区若本町2-10-2 神田ウサミビル8階

製造販売元 **株式会社 雪の元本店**

奈良県橿原市大谷町182番地

お客様相談室 TEL:0744-22-2440

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

フリーダイヤル 0120-149-931