

△使用上の注意



■相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること●本剤の服用により、胃部不快感、下痢、発疹等の症状があらわれた場合。2.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】●体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善●疲労の回復・予防●虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防：肩・首・腰又は膝の不調、疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肌の不調（肌荒れ・肌の乾燥）、冷えやすい・血行が悪い、骨又は歯の衰え●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ●病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給**【用法・用量】**成人（15歳以上）1日1回1本（50mL）を服用する。●用法・用量を厳守すること（他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること）。●本剤は、まれに沈殿や浮遊物を生じることがある。よく振って服用すること。

リョウシン コンドロイ ドリンク

指定医薬部外品

虚弱体質に伴う身体不調の改善・予防
肩・首・腰・ひざの不調
疲労回復や栄養補給に

ビタミンB

タウリン

コンドロイチン

50mL



富山常備薬

販売名：リキタスCOVE

【成分・分量】1日量1本（50mL）中 トコフェロール酢酸エステル50mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム120mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩5mg、ニコチン酸アミド20mg、タウリン500mg、L-アルギニン塩酸塩50mg 添加物：白糖、D-ソルビトール、クエン酸ナトリウム水和物、クエン酸水和物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、安息香酸ナトリウム、カラメル、パラベン、香料、エタノール、プロピレングリコール（アルコール0.1mL以下）●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。**【保管及び取扱い上の注意】**（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。（2）小児の手の届かない所に保管すること。（3）他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。（4）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。（5）加温、冷凍はさけること。

●お問い合わせ

〈発売元〉株式会社富山常備薬
富山県富山市丸の内1-8-17

☎0120-158-777

受付時間：9時～18時（年中無休）

〈製造販売元〉田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50

ビン：ガラス キャップ：金属

RL02

使用期限

製造番号



4 580544 061119