

販売名：トメテルEX 第2類医薬品 225錠入 【漢方薬】

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

⚠️ 使用上の注意

👤 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 ①医師の治療を受けている人。②妊婦又は妊娠していると思われる人。③胃腸が弱く下痢しやすい人。④のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。⑤今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	皮膚	消化器	その他
症状	発疹・発赤、かゆみ	食欲不振、胃部不快感、腹痛	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	間質性肺炎	肝機能障害
症状	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。：下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能・効果：体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）

■用法・用量：次の量を食前又は食間にコップ半分以上の水又は白湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠 ○○○○○	3回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>用法・用量を厳守してください。

■成分・分量：15錠(4.8g)中(ケイヒ…0.5g・ゴシツ…1.5g・サンシュユ…1.5g・サンヤク…1.5g・ジオウ…2.5g・シャゼンシ…1.5g・タクシャ…1.5g・ブクリョウ…1.5g・ブシ末…0.5g・ボタンピ…1.5g)牛車腎気丸エキス(1/2量)2.5g 添加物として、カルメロースカルシウム、含水二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウムを含む。本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

■保管及び取扱い上の注意

①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)④アルミ袋の中に乾燥剤を入れています。誤って服用しないよう注意してください。⑤使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

【発売元】さくらフォレスト株式会社 福岡県福岡市中央区警固2丁目12番23号

【製造販売元】劑盛堂薬品株式会社 和歌山県和歌山市太田2丁目8番31号

副作用被害救済制度 0120-149-931

さくらの森
相談窓口

☎0120-842-555

【月～金】9:00～18:00 【定休日】土・日・祝