



ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

麦門冬湯配合 **のどじゅん 喉潤漢方トローチ**

本剤は、「咳を鎮め、のどを潤す・炎症を抑える・滋養強壮等」の作用を有する生薬からなる麦門冬湯のエキスをを使用したトローチ剤です。

麦門冬湯は、乾燥による咳（からげき）、気管支炎や気管支ぜんそく等に用いられます。

本剤は、のどへ局所的に適用するため、トローチ剤としており、かまずに口中でゆっくりと溶かしてください。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 水様性の痰の多い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 次の症状がある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（からげきに使用する場合には1週間位）使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症：からげき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

【用法・用量】

食間または空腹時に、1錠ずつ口の中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。
(食間とは「食事と食事の間」のことを指します。)

年 齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上) 及び 7 歳以上	2錠	3回
5 歳以上 7 歳未満	1錠	
5 歳未満	使用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)本剤はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、のみ込んでりしないでください。
- (4)本剤は5歳未満の乳幼児には使用させないでください。
- (5)トローチ剤の取り出し方
右図のようにトローチ剤の入っているPTPシート凸部を指先で強く（PTPシートの取り出し図）
押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してください（誤ってそのまま
のみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につな
がります。）。
おしだす 

【成分・分量】

1日量[6錠(7,200mg)]中に麦門冬湯エキス(1/2量)2,900mgを含有しています。

日局バクモンドウ・・・5.0g	日局ハ ン ゲ・・・2.5g	
日局コ ウ ベ イ・・・2.5g	日局タ イ ソ ウ・・・1.5g	
日局ニ ン ジ ン・・・1.0g	日局カ ン ゾ ウ・・・1.0g	より抽出

添加物として、粉末還元麦芽糖水アメ、結晶セルロース、ポビドン、ケイ酸カルシウム、スクラロース、トメントール、ステアリン酸マグネシウム、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)本剤は吸湿性をもっています。アルミ袋を開封し、日数を経ると湿気の多いときは、変色することがあります。ご使用の残りは、保管方法(特に湿気)に注意し、変色したものは使用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室

〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

☎ 0120-415-688

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

日新薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1